


**D.74** **Eulers Abstand  $OI$ .** Für den Abstand  $d \equiv OI$  zwischen den Mittelpunkten von Um- und Inkreis eines Dreiecks gilt:

$$OI^2 = d^2 = R^2 - 2rR \quad \text{oder} \quad \frac{1}{R+d} + \frac{1}{R-d} = \frac{1}{r}. \quad (\text{D.14})$$

**D.74** *Beweis:* (Bild) Aus Aufgabe D.3 wissen wir, daß die verlängerte Winkelhalbierende von  $\angle ACB$ , auf der  $I$  liegt, die Mittelsenkrechte von  $AB$ , auf der  $O$  liegt, gerade im Punkt  $F$  auf dem Umkreis schneidet.  $FM$  sei der Durchmesser des Umkreises senkrecht zu  $AB$ . Schreiben wir zur Abkürzung  $\varepsilon = \frac{1}{2}\angle ACB$  und  $\eta = \frac{1}{2}\angle CAB$ , so ist aus dem Bild leicht  $\angle AMF = \angle ACF = \varepsilon$  und  $\angle FAB = \angle FCB = \varepsilon$  abzulesen. Der Außenwinkel im Dreieck  $CAI$  bei  $I$  beträgt  $\angle AIF = \varepsilon + \eta = \angle FAI$ ,  $\triangle FAI$  ist demzufolge gleichschenkelig:  $FA = FI$ . Nun können wir den Sehnensatz aus Aufgabe K.11 vorteilhaft auf die Sehnen  $FC$  und  $KL$  mit ihrem Teilungspunkt  $I$  anwenden:



$$\begin{aligned}
 R^2 - d^2 &= KI \cdot IL \\
 &= FI \cdot IC = FA \cdot IC \\
 &= FM \frac{FA/FM}{IY/IC} IY \\
 &= FM \frac{\sin \varepsilon}{\sin \varepsilon} IY = FM \cdot IY = 2Rr.
 \end{aligned}$$

Damit wird  $d^2 = R^2 - 2rR$ .  $\square$

*Bemerkung:* Aus  $d^2 \geq 0$  folgt hieraus sofort die Ungleichung von CHAPPLE-EULER:  $R \geq 2r$  (vgl. Aufgabe G.31).