

G.31 In allen Dreiecken gilt:

$$3\sqrt{3}R \geq 2s \geq 6\sqrt{3}r. \triangle \tag{G.31}$$

Insbesondere folgt daraus aufgrund der Trichotomie die bekannte **Ungleichung von Chapple-Euler**.


$$R \geq 2r. \triangle \tag{G.32}$$

G.31 *Beweis:* (Bild) In den gleichschenkligen Dreiecken AOB , BOC , COA gilt mit den Winkeln $\angle OAB \equiv \delta$, $\angle OBC \equiv \varepsilon$, $\angle OCA \equiv \eta$, von denen jeder offensichtlich kleiner als ein Rechter ist:

$$\cos \delta = \frac{c}{2R}, \quad \cos \varepsilon = \frac{a}{2R}, \quad \cos \eta = \frac{b}{2R},$$

also $a+b+c = 2s = 2R(\cos \delta + \cos \varepsilon + \cos \eta)$. Die Kosinus-Funktion ist in $[0, \frac{\pi}{2}]$ streng konkav, woraus mittels der JENSENSchen Ungleichung (vgl. Aufgabe U.26)

$$\frac{1}{3}(\cos \delta + \cos \varepsilon + \cos \eta) \leq \cos \left(\frac{\delta + \varepsilon + \eta}{3} \right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



folgt. Beides zusammen ergibt die linke Seite der Ungleichung $a + b + c = 2s \leq 3\sqrt{3}R$. Für die rechte Seite setzen wir in $\tau_1^3 \geq 27\tau_3$ (U.64) die Ausdrücke $\tau_1 = s$ und $\tau_3 = r^2s$ ein. \square

Alternativer *Beweis* für die Ungleichung von CHAPPLE-EULER: Nach Aufgabe D.74 gilt stets $d^2 = R^2 - 2rR$, wobei $d \equiv OI$ der Abstand zwischen Umkreis- und Inkreiszentrum ist. Selbstverständlich ist $d^2 \geq 0$, woraus aus obiger Gleichung nach Umstellen und Division durch $R > 0$ die Behauptung folgt. \square